

ANALISIS KARAKTERISTIK LAPISAN SEDIMEN BERDASARKAN DATA MIKROTREMOR DI AREA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNILA

By Hesti Hesti

ANALISIS KARAKTERISTIK LAPISAN SEDIMEN BERDASARKAN DATA MIKROTREMOR DI AREA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNILA

ANALYSIS OF SEDIMENT CHARACTERISTIC BASED ON MICROTREMOR DATA IN AREA OF RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNILA

Hesti^{1*}, Suharno², Rahmi Mulyasari³, Akroma Hidayatika⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Teknik Geofisika, Fakultas Teknik, Universitas Lampung

Keyword:

Amplification;
Dominant frequency;
HVSr;
Sediment;
Unila Educational Hospital.

Correspondent Email:

hesti.9201@eng.unila.ac.id

Abstrak. Provinsi Lampung memiliki kondisi geografis kompleks, dilewati jalur bukit barisan dan terletak diantara dua lempeng yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Provinsi Lampung juga merupakan wilayah yang dekat dengan Samudera Hindia dan terletak pada zona Sesar Semangko (Sumatra Transform Fault Zone) yang terbentang dari Aceh sampai Teluk Semangka Lampung. Dengan demikian penataan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi gempabumi merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik lapisan batuan sedimen pada area pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung (RSP Unila) sebagai bagian dari tahapan mitigasi bencana gempabumi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode mikrotremor dan analisis geologi permukaan. Data pengukuran metode mikrotremor dianalisis dengan menggunakan metode analisis Horizontal Vertical Spectrum Ratio (HVSr) untuk mendapatkan nilai amplifikasi (A₀) dan frekuensi dominan (f₀). Hasil dari analisis HVSr diperoleh nilai frekuensi dominan (f₀) berkisar 0.65–1.2 Hz, amplifikasi (A₀) berkisar 3.33–5.62, dan nilai periode dominan (T₀) 0.6–1.5 sekon. Nilai A₀, f₀, T₀ diinterpretasikan dengan mengacu data literatur dan geologi permukaan yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa daerah penelitian memiliki jenis lapisan sedimen yang rentan terhadap peristiwa gempabumi.

Abstract. Lampung Province is in a complex geographical condition, its area is traversed by a row of hill lines and located between two plates, namely the Indo-Australian and the Eurasian. Lampung Province is near with the Indian Ocean and it's located in the Semangko Fault Zone (Sumatra Transform Fault Zone)

which stretches from Aceh to Teluk Semangka Lampung. Thus, spatial planning and infrastructure development based on mitigation earthquakes are very important things to do in this area. The purpose of this study was to determine the disasters of rock layers in the construction area of the Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Unila as part of the earthquake disaster mitigation phase. This research was conducted using the microtremor method and surface geological analysis. The method of measuring microtremor data was analyzed using the Horizontal Vertical Spectrum Ratio (HVSR) method to get the amplification value (A₀) and the dominant frequency (f₀). The results of the HVSR analysis showed the dominant frequency (f₀) ranged from 0.65 to 1.2 Hz, the amplification (A₀) ranged from 3.33 to 5.62, and the dominant period value (T₀) from 0.6 to 1.5 seconds. Then the interpretation is carried out by analyzing the A₀, f₀, T₀ value with the relevant literature and surface geology data. The results show that the study area is vulnerable to the earthquakes even.

1. PENDAHULUAN

Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki kondisi geografis kompleks, dilewati jalur bukit barisan dan terletak diantara dua lempeng yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Provinsi Lampung juga merupakan wilayah yang dekat dengan Samudera Hindia dan terletak pada zona Sesar Semangko (Sumatra Transform Fault Zone) yang terbentang dari Aceh sampai Teluk Semangka Lampung dengan kisaran panjang mencapai 900 km (BMKG, 2021). Lempeng tektonik selalu mengalami pergerakan secara dinamis dan pergerakan ini dapat dirasakan hingga permukaan bumi yang sering disebut sebagai peristiwa gempabumi tektonik. Pergerakan lempeng Samudra di bawah laut dapat memicu terjadinya gempa bawah laut dan menyebabkan gelombang pasang tsunami. Diketahui Lempeng tektonik Indo Australia mengalami pergerakan dengan kecepatan 6 cm/tahun sampai dengan 14 cm/tahun. Hal ini tentunya membuat Provinsi Lampung rentan terhadap peristiwa gempabumi. Penataan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi gempabumi adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan pada wilayah yang rentan terjadinya gempabumi.

Universitas Lampung merupakan universitas negeri yang berada di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Universitas Lampung berusaha memberikan manfaat

yang lebih besar kepada masyarakat dengan membangun sarana pendidikan dan kesehatan berupa rumah sakit. Pembangunan rumah sakit tentunya harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sehingga mampu menjadi fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Suatu daya dukung lingkungan atau “sustain” dalam pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya dalam menjaga apa yang menjadi milik kita agar tetap ada (Mulyaningsih, 2010).

Salah satu upaya untuk menjaga Rumah Sakit Pendidikan Unila agar sustain adalah dengan membangun fasilitas umum ini dengan berbasis pada mitigasi gempabumi, mengingat keberadaan Rumah Sakit ini pada lokasi yang rawan gempabumi.

Migrasi awal yang perlu dilakukan adalah mengetahui karakteristik lapisan batuan sedimen di wilayah ini. Lapisan batuan sedimen dengan frekuensi rendah dan amplifikasi tinggi dapat memberikan respon gelombang yang semakin besar dan memberikan guncangan yang semakin besar pada infrastruktur di permukaan bumi. Informasi mengenai frekuensi lapisan batuan sangat penting untuk menghindari terjadinya resonansi terhadap bangunan yang memiliki

tingkat frekuensi yang sama apabila gempabumi terjadi (Mucciarelli dkk., 2007).

Metode geofisika adalah metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi perihal kondisi bawah permukaan. Lapisan sedimen ⁹ bawah permukaan dapat di deteksi dengan salah satu metode geofisika yaitu metode mikrotremor. Metode mikrotremor merupakan metode yang efektif untuk mengetahui karakteristik lapisan bawah permukaan. Metode mikrotremor merupakan metode yang efektif, murah dan dapat diterapkan dilingkungan perkotaan (Mucciarelli dkk., 2007).

Metode mikrotremor telah digunakan dalam berbagai macam kasus untuk menyelidiki bawah permukaan terutama untuk studi gempabumi. Satria dkk. (2019) melakukan penelitian menggunakan metode mikrotremor dengan analisis HVSR untuk mengetahui karakteristik indeks kerentanan seismik di Kota Jambi. Daryono (2011) melakukan penelitian menggunakan metode mikrotremor untuk menganalisis seismisitas di area Graben Bantul. Jamroni dkk. (2017) melakukan penelitian dengan metode mikrotremor dan analisis HVSR di Makassar untuk mengetahui karakteristik lapisan sedimen dan hubungannya dengan kerusakan bangunan akibat Gempa Makassar tahun 2015. Marsyelina dkk. (2014) melakukan penelitian pada jalur sesar Opak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hesti dkk. (2018) melakukan penelitian untuk analisis gempa di daerah Prambanan Yogyakarta-Jawa tengah.

Pada penelitian ini dilakukan analisis ¹¹ lapisan batuan di bawah permukaan pada area pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung (RSP Unila) dengan ²⁹ metode mikrotremor dan analisis geologi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik lapisan batuan sedimen pada area pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung sebagai bagian dari tahapan mitigasi bencana gempabumi.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menunjang pembangunan fasilitas umum yang berkelanjutan.

¹³ 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Geologi Daerah Penelitian

Daerah Penelitian secara geografis ¹⁵ berada di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung adalah wilayah yang memiliki dataran bergelombang dan ketinggian topografi 200 - 300 meter di atas permukaan laut. Lahan pada wilayah ini banyak dimanfaatkan sebagai area pertanian, perkebunan, dan pemukiman.

Menurut ²⁶ (Mangga dkk., 1993), Secara regional daerah penelitian terdiri dari 3 formasi batuan yaitu:

- ² Endapan Alluvium dengan komposisi pasir, lempung dan kerikil
- Endapan Gunung api Muda dengan komposisi lava, andesit, breksi dan tuf
- Formasi Lampung dengan komposisi Tuf berbatu apung, tuf riolitik, tuf padu tufit, batu lempung tufan dan batu pasir tufan. ²³

Geologi regional daerah penelitian dapat dilihat pada (Gambar 1).


2.2. Gempabumi dan Respon Lapisan Batuan Sedimen (Tanah)

Gempabumi merupakan ¹⁹ getaran yang terjadi di permukaan bumi, yang diakibatkan oleh pergerakan kerak bumi (Mulyaningih, 2010). Gerakan tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif (sesar), aktivitas gunungapi dan runtuh batuan.

Gelombang gempabumi akan memberikan efek ke permukaan bumi tergantung pada besarnya magnitudo gempa dan kondisi geologi permukaan suatu daerah. Kondisi geologi permukaan meliputi karakteristik lapisan batuan yang dapat memberikan respon terhadap adanya gelombang gempa.

Karakteristik lapisan batuan yang lunak, tebal dan memiliki amplifikasi yang tinggi dapat membuat lapisan permukaan bumi mendapat

pengaruh guncangan yang lebih kuat dan merusak.



Gambar 1. Peta Geologi Regional Penelitian, kotak merah area penelitian (Mangga dkk., 1993).

2.3. Metode Mikrotremor dan HVSR

Mikrotremor dapat didefinisikan sebagai derau perioda pendek yang berasal dari sumber buatan atau dapat di definisikan sebagai getaran harmonik alami tanah yang timbul akibat getaran mikro bawah permukaan atau peristiwa alam lainnya. Metode mikrotremor telah banyak digunakan pada penelitian mengenai struktur tanah (soil investigation) untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik lapisan tanah (sedimen) yang digunakan dalam lingkup studi kegunaan.

Metode mikrotremor biasanya digunakan untuk menganalisis efek geologi permukaan dan karakteristik sedimen akibat gerakan tanah pada peristiwa gempa bumi (Lermo & Chavez-Garcia, 1993; Nakamura, 1989).

Data hasil pengukuran mikrotremor dapat dianalisis dengan menggunakan metode Horizontal to Vertical Spectrum Ratio (HVSR). Metode HVSR adalah sebuah teknik empiris untuk memperkirakan karakteristik resonansi lapisan sedimen di bawah permukaan (Nakamura, 1989). Di tiap titik ukur akan dihitung besarnya nilai frekuensi resonansi dan amplifikasi (penguatan) lapisan sedimen.

Ada dua parameter penting yang diperoleh dari pemrosesan data menggunakan metode HVSR yaitu frekuensi natural (f_0) dan amplifikasi (A). Kedua parameter tersebut menginterpretasikan kondisi geologi suatu daerah (Tanjung dkk., 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di area pembangunan RSP Unila, dengan melakukan pengukuran metode mikrotremor sebanyak 10 titik dengan 2 lintasan (Gambar 2). Gambar 2 menunjukkan lokasi penelitian dengan warna hijau adalah vegetasi di area penelitian, warna coklat adalah bangunan RSP Unila.

Penelitian ini menggunakan metode mikrotremor single station dengan pengolahan data menggunakan software geopsy dengan analisis HVSR. Prosedur penelitian secara

dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap akuisisi data, pengolahan data dan interpretasi data. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengambilan data lapangan dengan menggunakan metode mikrotremor single station.

Pengukuran di lapangan menggunakan alat Reftek Seismometer dengan durasi pengukuran 20-30 menit. Durasi waktu ini digunakan untuk mendapatkan jangkauan nilai frekuensi yang maksimal sesuai dengan target. Data pengukuran terekam dalam bentuk sinyal dengan format CSV pada alat.



Gambar 2. Peta lokasi daerah penelitian.

Data mentah yang telah diperoleh dari pengukuran di lapangan dalam format CSV kemudian di konversi ke format *SAF, setelah konversi dilanjutkan pengolahan menggunakan Software Geophysical Signal

Database for Noise Array Processing (GEOPSY) versi 2.9.0.

Pengolahan data selanjutnya menggunakan metode Horizontal to Vertical Spectrum Ratio (HVSR) dengan mengacu pada SESAME (2004) untuk mendapatkan nilai faktor

8 frekuensi dominan (f_0), faktor periode dominan (T_0) dan faktor amplifikasi (A_0). Komponen vertikal pada kurva HVSR menunjukkan besarnya nilai amplifikasi (A_0) sedangkan komponen 21 horizontal menunjukkan besarnya nilai frekuensi dominan (f_0). Hasil pengolahan data mikrotremor dengan metode HVSR berupa periode dominan (T_0), frekuensi dominan (f_0) dan amplifikasi (A_0) kemudian diolah dengan menggunakan software Surfer untuk mendapatkan sebaran titik penelitian.

Interpretasi dilakukan dengan melakukan analisis data hasil dari pengolahan data dengan metode HVSR yaitu analisis data periode dominan (T_0), frekuensi dominan (f_0) dan amplifikasi (A_0). Dalam melakukan interpretasi juga digunakan data-data literatur dan juga data geologi sehingga diperoleh hasil interpretasi yang lebih valid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data mikrotremor dengan metode HVSR mengacu pada SESAME (2004) untuk mendapatkan data yang realibel. Hasil pengolahan data pada penelitian ini menghasilkan 2 jenis kurva yaitu clear peak dan multiple peak. Jenis kurva clear peak lebih mendominasi dibandingkan jenis kurva multiple peak dimana dari 10 titik pengukuran hanya satu titik saja merupakan jenis kurva multiple peak. Kurva clear peak adalah kurva yang ideal dalam pengolahan data mikrotremor karena realibility data kurva clear peak ini memiliki verifikasi yang terpenuhi berdasarkan SESAME European Project. Maka natural frekuensi yang didapat dari analisis puncak kurva ini dapat dipercayai sebagai natural frekuensi site tersebut.

4.1. Peta Persebaran Analisis Nilai Frekuensi Dominan (f_0)

Bedasarkan pengolahan data dengan metode HVSR diperoleh peta sebaran nilai frekuensi dominan seperti pada Gambar 3

yang diinterpretasikan bahwa di area RS Unila memiliki nilai frekuensi dominan berkisar antara 0.65–1.2 Hz (Gambar 4). Nilai frekuensi dominan suatu daerah menunjukkan tingkat ketebalan sedimen dan jenis batuan nya seperti dijelaskan pada Tabel 1.

Persebaran nilai frekuensi dominan di daerah penelitian ($0.65 < f_0 < 1$ Hz) menurut Kanai (1983) (BMKG, 1998) merupakan daerah dengan klasifikasi jenis IV dengan indikasi ketebalan sedimen permukaannya masuk dalam kategori lebih dari 30 meter dan termasuk ke dalam batuan alluvial.

Lapisan batuan sedimen yang tebal memiliki bersikap rentan terhadap guncangan gempabumi. Semakin tebal lapisan sedimen suatu permukaan maka akan semakin rentan terhadap guncangan gempabumi.

4.2. Peta Persebaran Analisis Nilai Periode Dominan (T_0)


Bedasarkan peta sebaran nilai periode dominan pada Gambar 5 dapat diinterpretasikan bahwa di area RS Unila mempunyai nilai periode dominan diantara 0.6–1.5 sekon.

Pengelompokan jenis tanah mengacu pada nilai periode dominan menurut Omote-Nakajima (Kanai, 1983) dibagi menjadi 4 jenis yaitu jenis A dengan nilai frekuensi antara 0.05–0.10 s (detik) yang mengindikasikan karakter jenis batuan sedimennya keras, jenis A dengan nilai periode 0.10–0.25 s (detik) mengindikasikan karakter batuan sedimennya sedang, jenis B dengan nilai periode 0.25–0.4 s (detik) mengindikasikan karakter jenis batuan sedimennya lunak, dan jenis C dengan nilai periode lebih dari 0.4 s (detik) mengindikasikan karakter jenis batuan sedimennya sangat lunak.


Persebaran nilai periode dominan pada area RS Unila sebesar $T_0 > 0.4$ s. Daerah tersebut merupakan daerah dengan klasifikasi jenis C menurut Omote-Nakajima (Kanai, 1983) dengan indikasi karakter jenis batuan

8
 sedimennya sangat lunak berupa batuan alluvial, yang terbentuk dari sedimentasi delta, top soil 18mpur. Berdasarkan data dari peta geologi daerah penelitian merupakan endapan

alluvium (alluvial) yang terdiri dari pasir, lempung dan kerikil. Daerah dengan lapisan sedimen lunak pada permukaan bumi bersikap rentan terhadap guncangan gempa bumi.




Gambar 3. Contoh kurva hasil pengolahan data microtremor dengan metode HVSR dengan 10 titik pengukuran.



Gambar 4. Peta Persebaran Frekuensi Dominan RSP Unila (fo).

1 **Tabel 1.** Klasifikasi tanah berdasarkan nilai frekuensi natural mikroseismik oleh Kanai (1983) (BMKG, 1998).

Klasifikasi Tanah	Frekuensi Natural	Klasifikasi Kanai	Ketebalan sedimen	
Tipe IV	Jenis I	6.67-20	1 Batuan tersier atau lebih tua. Terdiri dari batuan Hard sandy, gravel, dan lainnya.	Sangat tipis dan didominasi batuan keras.
Tipe III	Jenis II	4.0-10	3 Batuan tersier atau lebih tua. Terdiri dari batuan Hard sandy, gravel, dan lainnya.	Kategori menengah 5-10m.
Tipe II	Jenis III	2.5-4	Batuan alluvial dengan ketebalan lebih dari 5 m. Terdiri dari sandy gravel, sandy hard clay, loam, dan lainnya.	Kategori tebal 10-30 m.
1 Tipe I	Jenis IV	Kurang dari 2.5	Batuan alluvial yang terbentuk dari sedimentasi delta, top soil, lumpur, dan lainnya. Kedalaman \geq 30 m.	Sangat tebal.



Gambar 5. Peta Persebaran Periode Dominan (T0).


4.3. Peta Persebaran Analisis Nilai Amplifikasi (A0)

Berdasarkan peta sebaran nilai amplifikasi pada Gambar 6 dapat diinterpretasikan bahwa area Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung memiliki nilai amplifikasi berkisar antara 3.33–5.62 kali.

Zona amplifikasi tanah menurut Marjiyono (2010) dapat dibagi menjadi 4 keterangan resiko yaitu kategori resiko rendah dengan nilai amplifikasi ($0 < A_0 < 3$ kali), kategori resiko sedang dengan nilai amplifikasi ($3 < A_0 < 6$ kali), kategori resiko tinggi dengan nilai amplifikasi

($6 < A_0 < 9$ kali), dan kategori resiko sangat tinggi dengan nilai amplifikasi ($A_0 > 9$ kali).

Berdasarkan hasil nilai perhitungan amplifikasi di Area Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung berkisar antara 3.33–5.62 kali ($3 < A_0 < 6$ kali), sehingga dapat dikatakan bahwa di Area Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung tersebut termasuk wilayah dengan kategori resiko sedang terhadap guncangan gempabumi.



Gambar 6. Peta Persebaran Amplifikasi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini diantaranya:

- Daerah penelitian memiliki nilai frekuensi dominan berkisar antara 0.65-1.2 Hz yang mengindikasikan ketebalan sedimen permukaannya lebih dari 30 meter.
- Daerah penelitian mempunyai nilai periode dominan diantara 0.6–1.5 sekon dan

dengan indikasi karakter jenis batuan sedimennya sangat lunak berupa batuan alluvial, yang terbentuk dari sedimentasi delta, topsoil, lumpur.

- Daerah penelitian memiliki nilai amplifikasi 3.33–5.62 kali dan merupakan daerah dengan kategori resiko sedang.
- Daerah penelitian termasuk daerah yang rentan ketika terjadi gempabumi ditandai

dengan ⁴ lapisan sedimen yang tebal dan lunak serta nilai amplifikasi menengah.

¹²
UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Teknik Universitas Lampung) sebagai pemberi dana pada kegiatan penelitian pada skema DIPA FT Unila.

ANALISIS KARAKTERISTIK LAPISAN SEDIMEN BERDASARKAN DATA MIKROTREMOR DI AREA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNILA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	iptek.its.ac.id Internet	64 words — 2%
2	jurnal.polinela.ac.id Internet	30 words — 1%
3	core.ac.uk Internet	29 words — 1%
4	www.jurnal-geofisika.or.id Internet	28 words — 1%
5	repository.lppm.unila.ac.id Internet	27 words — 1%
6	text-id.123dok.com Internet	27 words — 1%
7	id.scribd.com Internet	21 words — 1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	20 words — 1%
9	digilib.uin-suka.ac.id Internet	18 words — 1%

10	Wahyu Hidayat, Muhammad Zaki, Cici Arti, Rio Adi Pangestu. "Analysis of ground shear strain and site class on Wonogiri Dam and surrounding area, Central Java", AIP Publishing, 2020 Crossref	16 words — 1%
11	issuu.com Internet	16 words — 1%
12	conference.umk.ac.id Internet	15 words — 1%
13	Rahmi Mulyasari, IG Boy Darmawan, Dersan Surya Effendi, Sugeng Purwo Saputro, Hesti Hesti, Akroma Hidayatika, Nandi Haerudin. "APLIKASI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS UNTUK ANALISIS BIDANG GELINCIR DAN STUDI KARAKTERISTIK LONGSORAN DI JALAN RAYA SUBAN BANDAR LAMPUNG", Jurnal Geofisika Eksplorasi, 2020 Crossref	14 words — 1%
14	iep.edu.gr Internet	13 words — 1%
15	repository.radenintan.ac.id Internet	12 words — < 1%
16	eprints.uny.ac.id Internet	11 words — < 1%
17	jurnal.stmkg.ac.id Internet	11 words — < 1%
18	repo.unand.ac.id Internet	10 words — < 1%
19	www.peringkatkelas.my.id Internet	

10 words — < 1%

20 ejournal.radenintan.ac.id
Internet

9 words — < 1%

21 ejurnal.undana.ac.id
Internet

9 words — < 1%

22 income.id
Internet

9 words — < 1%

23 ojs.unimal.ac.id
Internet

9 words — < 1%

24 www.researchgate.net
Internet

9 words — < 1%

25 www.sttintheos.ac.id
Internet

9 words — < 1%

26 digilib.unila.ac.id
Internet

8 words — < 1%

27 e-journals.unmul.ac.id
Internet

8 words — < 1%

28 ejournal.iainbengkulu.ac.id
Internet

8 words — < 1%

29 es.scribd.com
Internet

8 words — < 1%

30 konteks.id
Internet

8 words — < 1%

31 www.scribd.com

Internet

8 words — < 1%

32 idoc.pub
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON